

PerPiel

Vitamina A - Vitamina E - Alantoína

CREMA / EMULSIÓN

USO EXTERNO

PerPiel **CREMA**

Composición:

Cada 100 g de crema contiene:

Vitamina A (como Palmitato) 600.000 UI, Alantoína 250 mg, Vitamina E (como Acetato) 50 mg, Alcohol cetearílico / Ceteareth 20 9 g, Estearato de glicerilo / Ceteareth 20 4,5 g, Estearato de propilenglicol 4 g, Propilenglicol 3,5 g, Glicerina 3 g, Sorbitol 70 % 2,5 g, Vaselina líquida 2,5 g, Estearato de tridecilo y Dicaprilato de neopentilglicol / Dicaprato y tridecil trimellitato 2 g, C 12-15 Alquil benzoato 2 g, Polisorbato 60 1,5 g, Miristato de Miristilo 1 g, Dimeticona 0,9 g, Metilparabeno 120 mg, Cloruro de benzalconio 100 mg, Propilparabeno 50 mg, EDTA disódico 50 mg, Citrato de sodio dihidrato 50 mg, Acido cítrico 50 mg, Hidróxido de sodio 22 mg, Butilhidroxitolueno 20 mg, Butilhidroxianisol 10 mg, Esencia 0,15 ml, Agua purificada c.s.p. 100 g.

PerPiel **EMULSIÓN**

Composición:

Cada 100 g de emulsión contiene:

Vitamina A (como Palmitato) 500.000 UI, Alantoína 250 mg, Vitamina E (como Acetato) 50 mg, Propilenglicol 3,5 g, Alcohol cetearílico / Ceteareth 20 3,1 g, Glicerina 3 g, Sorbitol 70 % 2,5 g, Vaselina líquida 2,5 g, Estearato de glicerilo / Ceteareth 20 2 g, Estearato de tridecilo y Dicaprilato de neopentilglicol / Dicaprato y tridecil trimellitato 2 g, C 12-15 Alquil benzoato 2 g, Polisorbato 60 1,4 g, Miristato de Miristilo 1 g, Dimeticona 0,8 g, Carbomero 260 mg, Metilparabeno 120 mg, Cloruro de benzalconio 100 mg, Hidróxido de sodio 72 mg, Propilparabeno 50 mg, EDTA disódico 50 mg, Citrato de sodio dihidrato 50 mg, Butilhidroxitolueno 20 mg, Butilhidroxianisol 10 mg, Esencia 0,15 ml, Agua purificada c.s.p. 100 g.

Acción Terapéutica:

Protectora y regeneradora de los tejidos epiteliales. Código ATC: D02AX

Indicaciones:

- Prevención de estrías principalmente en los muslos, glúteos, caderas y senos.
- Ayuda a prevenir durante el embarazo y post parto, la aparición de estrías atróficas y grietas del pezón.
- Cuidado de la piel seca y prevención de arrugas.

Acción Farmacológica:

La vitamina A promueve la proliferación y diferenciación celular de los tejidos, fortalece el sistema inmune, regula el proceso de la inflamación y la producción de sebo. Colabora en la formación y mantenimiento de las membranas mucosas y de la piel. La vitamina E es un agente antioxidante que protege a los tejidos de la acción nociva de los radicales libres. La alantoína estimula la proliferación y reconstitución de los tejidos, tiene acción queratolítica.





Farmacocinética:

PERPIEL, luego de su aplicación tópica sobre piel intacta, se absorbe mínimamente a nivel sistémico. Dicha absorción aumenta en caso de heridas, úlceras, procesos inflamatorios y con el uso de vendajes oclusivos (se debe evitar).

Posología y Modo de Uso:

Aplicar **PERPIEL**, una o dos veces por día en la zona a tratar, con un suave masaje circular, para favorecer su penetración. **PERPIEL** es hipoalérgica.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a los principios activos o cualquier componente de la fórmula.
- Eczema.
- Uso concomitante de otros medicamentos que contengan Vitamina A, por riesgo de intoxicación o sobredosis.

Advertencias y Precauciones:

Higienizar la piel antes de aplicar **PERPIEL**. Se desaconseja su aplicación en los senos antes de amamantar, para evitar el riesgo de ingestión por el bebé.

En casos de irritación severa de la piel, **PERPIEL** se aplicará cuando la zona este menos sensible.

Empleo en Pediatría: el riesgo de efecto sistémico de la vitamina A aplicada tópicamente en la piel, es mayor en el lactante y en el niño de primera infancia.

Reacciones Adversas:

Eczema de contacto luego del uso prolongado o con el empleo de vendajes oclusivos. El riesgo de hipervitaminosis A se considerará cuando la aplicación tópica se realice por períodos prolongados, en zonas extensas, bajo oclusión o sobre piel lastimada o quemada, sobre mucosas, o sobre la piel de bebés prematuros.

Sobredosificación:

No se han reportado casos de sobredosis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano ó comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Conservar a temperatura hasta 30° C y al abrigo de la luz.

Presentación:

PERPIEL Crema: Envases con 50 y 200 g.

PERPIEL Emulsión: Envases con 100, 200 y 400 g.



Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Director Técnico: Gastón L. Landsman, Farmacéutico.

Certificado N° 55.771

Fecha de última revisión: 02/09/2010

Elaboración y envasado:

Cnel. Méndez 440 (B1875DQJ), Wilde, Pcia. de Buenos Aires.

Laboratorios Bernabó S.A.

Terrada 2346 (C1416ARZ), C.A.B.A.

Tel.: (011) 4501-3278/79

www.laboratoriosbernabo.com



Laboratorios Bernabó

